Mintaküldési cím (Laboratórium):
Bel-Lab Eü. Kft.(sajátkezű felbontásra)
Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Bel C épület földszint
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
Tel: 06-22/886-476 Fax: 06-22/340-464;

Levelezési cím (Iroda):
Bel-Lab Eü. Kft.
8000 Székesfehérvár Szekfű Gyula u.10/a
számlaszám: OTP Bank 11736006-20379713
adószám: 14182664-1-07

Név		Beküldő orvos	
lakcím		Beküldő Intézet	
születési idő	TAJ:	fax	
e-mail/fax		e-mail	

ATOPY SCREEN (IgE) VIZSGÁLATKÉRŐ ADATLAP

Atopy Screen (IgE)		**Módszer**	**Eredmény**	**Referencia tartomány**
	Allergén	Blot		< 0,35 kU/l
1	- Dermatophagoides pter.			
2	- Dermatophagoides farinae			
3	- Mézelő méh			
4	- Darázsméreg			
5	- Csótány, német			
6	- Házi poratka			
7	- Macska			
8	- Kutya			
9	- Ló			
10	- Penicillium notatum			
11	- Cladosporium herbarum			
12	- Aspergillus fumigatus			
13	- Alternaria alternata			
14	- Borjúpázsi			
15	- Csomós ebír			
16	- Mezei komócsin			
17	- Termesztett rozs			
18	- Éger			
19	- Nyír			
20	- Mogyoró			
21	- Tölgy			
22	- Ciprus			
23	- Parlagfű			
24	- Feketeüröm			
25	- Lándzsás útifű			
26	- Latex			
27	- Paradicsom			
28	- Sárgarépa			
29	- Burgonya			
30	- Zeller			
31	- Tojásfehérje			
32	- Tojássárgája			
33	- Tehéntej			
34	- Tőkehal			
35	- Rák			
36	- Garnélarák			
37	- Szarvasmarha szérumalbumin			
38	- Alfa-laktalbumin			
39	- Béta-laktoglobulin			
40	- Kazein			
41	- Marhahús			
42	- Birka/bárány			

43	- Sütőélesztő			
44	- Búzaliszt			
45	- Rozsliszt			
46	- Rizs			
47	- Szójabab			
48	- Szezám			
49	- Földimogyoró			
50	- Mogyoró			
51	- Mandula			
52	- Alma			
53	- Kivi			
54	- Kajszibarack			
55	- CCD jelölő			
Minta beérkezési időpont:		Vizsgálat elvégzés időpontja:		

Eredmények értékelése:

Osztály	Koncentráció (kU/l)	Eredmény
0	< 0,35	Specifikus antitesteket nem mutattak ki.
1	0,35 ≤ sIgE < 0,7	Nagyon alacsony antitest titer, gyakran nincsenek klinikai tünetek, ahol szenzibilizáció jelentkezne.
2	0,7 ≤ sIgE < 3,5	Alacsony antitest titer, meglévő szenzibilizáció, gyakran a felső osztályba tartozó klinikai tünetekkel.
3	3,5 ≤ sIgE < 17,5	Jelentős antitest titer, általában klinikai tünetek jelentkeznek.
4	17,5 ≤ sIgE < 50,0	Magas antitest titer, szinte mindig klinikai tünetekkel
5	50,0 ≤ sIgE < 100	Nagyon magas antitest titer
6	≥ 100,0	Nagyon magas antitest titer

A diagnózis felállításához mindig figyelembe kell venni a beteg klinikai képét, valamint a szerológiai eredményeket.

Dr. Gervain Judit PhD
Laboratórium vezető főorvos
c. egyetemi docens
belgyógyász, gasztroenterológus, laboratóriumi szakorvos